



Памятка для пациента перед исследованиями под седацией(наркозом)

- Не курить, не использовать жевательную резинку.
- Почистить зубы, обязательно прополоскать полость рта.
- Выпить все плановые лекарства (утром или днем) – запить одним глотком воды (15мл. – 1ст.л.) не позднее чем за 2 - 3 часа до процедуры!
- Если вы постоянно принимаете какие-либо лекарственные препараты или у вас имеется непереносимость каких-либо лекарств – сообщите перед исследованием об этом врачу-эндоскописту и врачу анестезиологу.
- Перед процедурой вам будет необходимо лично заполнить анкетный лист пациента.
- Не употреблять алкоголь минимум в течение 1 суток до и после перенесенного исследования.
- В течение дня исследования, от управления автомобилем следует воздержаться.
- После исследования под седацией желательно, чтобы вас сопровождали родственники или знакомые.
- **Пациентов старше 60 лет, просим при себе иметь результаты ЭКГ, сроком годности не более 2 недель.**
- Пациентам с индексом массы тела (ИМТ) менее 17 и более 40 проведение седации может быть противопоказано в связи с высоким риском анестезии и им будет предложена местная анестезия.
- **Окончательное решение по применению седации принимает анестезиолог, непосредственно, перед проведением процедуры.**

- Формула для определения ИМТ:

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{масса тела (кг)}}{\text{рост (м)}^2}$$

Желаем Вам крепкого здоровья!