

Памятка пациенту перед проведением исследования **ВИДЕОБРОНХОСКОПИЯ С АНЕСТЕЗИЕЙ**

В клинике «УГМК-Здоровье» исследование осуществляется с помощью гибкого фибробронхоскопа последнего поколения. Для пациента процедура безболезненна. Используется внутривенная анестезия. Во время исследования врач определяют выявленные изменения - воспалительные явления, наличие эрозий, опухоли. Исследование сопровождается прицельной биопсией с выявленных измененных участков. При необходимости исследование может быть записано на электронный носитель (CD).

Необходимые документы и условия:

- Необходимо иметь **НАПРАВЛЕНИЕ** (или письменную рекомендацию с подписью и печатью) от врача сроком **не более 2 мес.**

Исследование выполняется только при наличии назначения от врача пульмонолога/торакального хирурга.

- Результат КТ легких (сроком до 1 мес.).
- Пациентам **старше 60 лет** необходимо при себе иметь результаты ЭКГ с **ОПИСАНИЕМ**, сроком годности не более **1 месяца**.
- Пациентам **старше 65 лет** при себе иметь результаты ЭКГ с **ОПИСАНИЕМ**, сроком годности не более **1 месяца**, чтобы вас сопровождали родственники или знакомые.
- Пациентам **старше 70 лет** необходимо иметь результаты ЭКГ с **ОПИСАНИЕМ**, сроком годности не более **1 месяца**, чтобы вас сопровождали родственники или знакомые, а так же **допуск терапевта клиники УГМК-Здоровье** (требуется предварительная запись), где будет указано, что нет противопоказаний к проведению исследования.

Подготовка к БРОНХОСКОПИИ С АНЕСТЕЗИЕЙ

Исследование трахеи и бронхов проводится в первой половине дня строго натощак (не есть и не пить). Накануне рекомендуется принять **легкий** ужин утром в день исследования не есть. Утром почистить зубы и прополоскать рот водой. Не курить, не использовать жевательную резинку.

Непосредственно перед бронхоскопией с анестезией проводится **осмотр** врачом-анестезиологом. Обсуждаются подробно все вопросы, касающиеся здоровья пациента и сопутствующих заболеваний и решается вопрос о возможности проведения анестезии.

Пациентам с индексом массы тела (ИМТ) менее 17 и более 40 в проведении внутривенной анестезии может быть отказано, в связи с высоким риском анестезии и будет предложена местная анестезия.

Формула для определения ИМТ:

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{масса тела (кг)}}{\text{рост (м)}^2}$$

Обязательным условием проведения внутривенной анестезии является – не пить любую жидкость за 4 часа, не есть за 8 часов до процедуры.

Окончательное решение о возможности седации принимает врач-анестезиолог непосредственно перед проведением процедуры.

Если вы постоянно принимаете какие-либо лекарственные препараты или у вас имеется непереносимость каких-либо лекарств – сообщите перед исследованием об этом врачу-эндоскописту и врачу анестезиологу.

В день проведения анестезии запрещено вождение транспортного средства!

Важно: Прием варфарина, дабигатрана, ривароксабана и др. антикоагулянтов необходимо отменить за 2-3 дня до процедуры и не принимать в течение 2-3 суток после процедуры при взятии биопсийного материала и удалении полипов. **При отмене ВАРФАРИНА** за день до исследования сдать МНО, желательный уровень МНО на момент вмешательства должен быть менее 1,5.

Пациенты, принимающие антиагреганты (клопидогрель, аспирин, тромбо-асс, плавикс, кардиомагнил, аспирин-кардио и др.) должны отменить их прием за 7 дней до исследования. После проведения процедуры возобновить их прием.

О возможности отмены препаратов обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом!!!

Пациенты с признаками ОРВИ на исследование не допускаются!

Вам необходимо помнить, что действие анестетика продолжается около 30 минут, поэтому не следует полоскать рот или принимать пищу в течение часа после исследования. Нельзя сразу после исследования садиться за руль автомобиля.

Желаем Вам крепкого здоровья!