

Видеоэзофагогастродуоденоскопия (ВФГДС)

На протяжении жизни человека желудок подвергается многим неблагоприятным воздействиям. Желудок страдает при наличии вредных привычек, воздействии экологических факторов и стресса, поэтому эндоскопическое исследование рекомендуется проводить с целью раннего выявления гастрита, язвы или новообразований.

Метод позволяет врачу увидеть на экране внутреннюю поверхность органов: пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки при помощи гибкого оптического прибора - видеоэндоскопа. При этом определяется содержимое органа, состояние слизистой, выстилающей орган, и его функционирование. Визуально оцениваются выявленные болезненные изменения (если таковые имеются): воспалительные явления, эрозии, язвы, полипы. Завершается исследование прицельной биопсией с выявленных патологических участков, с помощью которой можно получить точные результаты: активность воспаления, присутствие бактерии хеликобактер пилори, наличие опухолевых клеток. Все исследования проводятся на оборудовании высокого уровня международной оценки, используются все современные способы диагностики патологических состояний слизистой. Биопсия выполняется по стандартной системе OLGA.

Необходимые документы и условия:

1. Необходимо иметь **НАПРАВЛЕНИЕ** (или письменную рекомендацию с подписью и печатью) от врача сроком не более 12 мес.

2. Пациентам старше 60 лет необходимо при себе иметь результаты **ЭКГ с ОПИСАНИЕМ**, сроком годности не более 1 месяца.

Рекомендуется, чтобы после окончания услуги до дома сопровождали родственники или знакомые.

3. Пациентам старше 65 лет необходимо при себе иметь результаты **ЭКГ с ОПИСАНИЕМ**, сроком годности не более 1 месяца.

(!) Обязательно, чтобы после окончания услуги до дома сопровождали родственники или знакомые.

4. Пациентам старше 70 лет необходимо при себе иметь результаты **ЭКГ с ОПИСАНИЕМ**, сроком годности не более 1 месяца, иметь **допуск терапевта клиники УГМК-Здоровье** сроком до 1 месяца (требуется предварительная запись на **медицинский осмотр терапевта**), где будет указано, что нет противопоказаний к проведению исследования.

(!) Обязательно, чтобы после окончания услуги до дома сопровождали родственники или знакомые.

5. Пациентам старше 80 лет необходимо при себе иметь результаты ЭКГ с **ОПИСАНИЕМ**, сроком годности не более 1 месяца, иметь **допуск терапевта клиники УГМК-Здоровье** сроком до 1 месяца (требуется предварительная запись на **прием терапевта**), где будет указано, что нет противопоказаний к проведению исследования.

(!) Обязательно, чтобы после окончания услуги до дома сопровождали родственники или знакомые.

6. Пациенты с признаками ОРВИ на исследование не допускаются!

7. В день проведения анестезии запрещено вождение транспортного средства!

Важно:

1. Прием варфарина, дабигатрана, ривароксабана и др. антикоагулянтов.

Препараты должны быть отменены лечащим врачом за 2-3 дня до исследования и не принимать в течение 2-3 суток после исследования при взятии биопсийного материала и удалении полипов. **При отмене ВАРФАРИНА** за день до исследования сдать МНО, желательный уровень МНО на момент вмешательства должен быть менее 1,5.

2. Прием антиагрегантов (клопидогрель, аспирин, тромбо-асс, плавикс, кардиомагнил, аспирин-кардио и др.)

Препараты должны быть отменены лечащим врачом за 7 дней до исследования. После проведения процедуры возобновить их прием.

3. Если в лечении сахарного диабета или избыточного веса Вы используете инъекционные препараты, просьба ознакомиться с инструкцией для своевременной отмены данных препаратов перед эндоскопией.

• Препараты **ЛИРАГЛУТИДА** (под названиями: Энлигрия, Мелитид, Виктоза, Саксенда) – отменяются не менее чем за 24 часа до процедуры.
Пациентам с сахарным диабетом 2 типа можно ставить эти препараты **только за день утром- перерыв до эндоскопии не менее 24 часа**.

• Препараты **СЕМАГЛУТИДА, ТИРЗЕПАТИДА** (под названиями: Семавик, Семавик Некст, Квинсента, Велгия, Велгия Эко, Семуглин, Инсудайв, Оземпик, Ребелсас (единственный таблетированный препарат), Тирзетта, Седжаро. Мунжаро) отменяются за 7 дней.

Пациентам с сахарным диабетом 2 типа, применяющим данные препараты, эндоскопия проводится на восьмой день после постановки продленного препарата, т.е. перерыв будет 7 дней, на 8-ой день возможно проведение исследования. **После выполнения эндоскопии проводится постановка препарата вечером или на следующее утро.**

При голодании у пациентов с сахарным диабетом необходим контроль гликемии.

4. В день исследования постоянные (от давления, сердечные и др) медикаменты принять не менее чем за 4 часа до исследования.

Подготовка:

- Вечером, накануне исследования, легкий ужин не позднее 18-19 часов.
- В день исследования не есть за 8 часов.
- Последний прием **любой жидкости не позднее, чем за 4 часа** до исследования
- Утром почистить зубы и прополоскать рот водой.
- До исследования не курить, не использовать жевательную резинку.