Памятка пациенту перед проведением исследования

ВИДЕОБРОНХОСКОПИЯ С ВНУТРИВЕННОЙ АНЕСТЕЗИЕЙ

Бронхоскопия является золотым стандартом диагностики заболеваний дыхательной системы.

В клинике «УГМК-Здоровье» исследование проводится с помощью гибкого видеобронхоскопа Olympus последнего поколения, что позволяет получать изображения высокой четкости и непревзойденного качества.

Бронхоскопию выполняют под внутривенной анестезией. Для пациента процедура безболезненна.

При необходимости исследование может быть записано на электронный носитель (CD).

Необходимые документы и условия:

1. Необходимо иметь **НАПРАВЛЕНИЕ** (или письменную рекомендацию с подписью и печатью) от врача сроком **не более 3 мес.**

Исследование выполняется только при наличии назначения от терапевта, пульмонолога, торакального хирурга или онколога.

2. Результат КТ легких (сроком до 1 мес.)

3. Всем пациентам необходимо иметь **допуск от врача- анестезиолога клиники «УГМК- Здоровье»** для проведения бронхоскопии под внутривенной анестезией. Требуется предварительная запись на услугу «Собеседование с врачом – анестезиологом». Срок действия заключения от врача- анестезиолога 1 месяц до проведения исследования.

4. Особые условия для пациентов, старше 60 лет:

- Пациентам старше 60 лет, на собеседование с врачом – анестезиологом необходимо предоставить результат **ЭКГ с описанием** сроком годности не более 1 месяца.
- Пациентам старше 70 лет на собеседование с врачом – анестезиологом необходимо предоставить **результат ЭКГ с описанием и заключение врача-терапевта клиники «УГМК- Здоровье»** (требуется предварительная запись на услугу «Медицинский осмотр у терапевта»). Срок действия результата ЭКГ и допуска терапевта до1 мес. перед приемом врача- анестезиолога.
- Пациентам старше 80 лет на собеседование с врачом – анестезиологом необходимо предоставить **результат ЭКГ с описанием и заключение врача-терапевта клиники «УГМК- Здоровье»** (требуется предварительная запись на услугу «Прием терапевта»). Срок действия результата ЭКГ и допуска терапевта до 1 мес. перед приемом врача- анестезиолога.

5. Обязательно, чтобы после окончания услуги, пациентов старше 60 лет до дома сопровождали родственники или знакомые.

6. В день проведения анестезии запрещено вождение транспортного средства**.**

7. Пациенты с признаками ОРВИ на исследование не допускаются!

Подготовка к БРОНХОСКОПИИ С АНЕСТЕЗИЕЙ

- Исследование трахеи и бронхов проводится строго натощак (не есть и не пить). Накануне рекомендуется принять **легкий** ужин.
- утром в день исследования **не есть**. Можно чистить зубы и прополоскать рот водой.
- Не курить, не использовать жевательную резинку.
- Постоянные (от давления, сердечные и др) медикаменты принять не менее чем за 4 часа до исследования.

Обязательным условием проведения внутривенной анестезии является – не пить воду за 4 часа, не есть и не пить другие жидкости за 8 часов до процедуры.

Окончательное решение о возможности седации принимает врач-анестезиолог непосредственно перед проведением процедуры.

Важно:

В день исследования постоянные (от давления, сердечные) медикаменты принять не менее чем за 4 часа до исследования.

- **Прием варфарина, дабигатрана, ривароксабана и др. антикоагулянтов**.

Препараты должны быть отменены лечащим врачом **за 2-3 дня до исследования** и не принимать в течение 2-3 суток после исследования при взятии биопсийного материала и удалении полипов. **При отмене ВАРФАРИНА** за день до исследования сдать МНО, желательный уровень МНО на момент вмешательства должен быть менее 1,5.

- **Прием антиагрегантов** (клопидогрель, аспирин, тромбо-асс, плавикс, кардиомагнил, аспирин-кардио и др.)

Препараты должны быть отменены лечащим врачом **за 7 дней до исследования**. После проведения процедуры возобновить их прием.

О возможности отмены препаратов обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом!!!

Если вы постоянно принимаете какие-либо лекарственные препараты или у вас имеется непереносимость каких-либо лекарств – сообщите перед исследованием об этом врачу-эндоскописту и врачу анестезиологу.

Непосредственно перед бронхоскопией с анестезией проводится осмотр врачом-анестезиологом. Обсуждаются подробно все вопросы, касающиеся здоровья пациента и сопутствующих заболеваний и решается вопрос о возможности проведения анестезии. Пациентам с индексом массы тела (ИМТ) менее 17 и более 40 в проведении внутривенной анестезии может быть отказано, в связи с высоким риском анестезии и будет предложена местная анестезия.

Формула для определения ИМТ:

$$\text{ИМТ} = \frac{\text{масса тела (кг)}}{\text{рост (м)}^2}$$

Желаем Вам крепкого здоровья!